

證保實切有用信版出求務

報識常藥醫會社名又

格人及驗經識學有者持主

筆主報本

本報特聘名醫法律顧問

刊日三福幸

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類

改良煎劑之討論 (三十三) (楊賢民)

馬刺 食品 日用雜物類
草棉 日用之品
草棉 外科之藥癰疽止血子
製爲油▲木棉寄生枝
三錢和瘦豬肉煮食治
久年便血症極效
不製
臘脂 辛溫多用于外治可製
膏或研末
茶 日用之品
黃連 當茶之品
糯米 甘溫補脾之品宜製膏
粟 食品
日食之品
蕎麥 甘寒而多用于外治
宜製粉備用
黑豆 甘寒雖日食之品然爲
內外科常用製膏研
末俱宜
小麥 甘微寒宜于提精
▲浮小麥亦同此
綠豆 甘寒最妙或製粉
煮或研末
薏苡仁 甘淡微寒最宜提精惟
爲煎劑所重用不可不
製膏也
紅糖 不再製
醋酒 不再製
生薑 辛溫宜散提精爲宜或
(未完)

豆腐 日食之品
鍋巴 用末不再提製
飯糰 焦滯用末不再提製
食鹽 不再提製
燕窩 甘淡而平服食之品不
宜入藥故不必製
右爲花果日用飲食之品。凡八
十二種。
以上分類之詳析。隨意寫來。
荒謬甚多。尚望讀者教我。

汪洋醫師 中西醫藥講義

最近編輯 最完備最切實用之醫書
▲講義內容
本講義凡計四科二千零五十九頁一萬七千餘字印刷精良絕無模糊不清之弊計廿六
厚册成一大盒歷經九版每逢一版必增以新發見之學說爲西醫之參考爲中醫家之大研究
▲講義科目
生理學 解剖學 病理學 診斷學 內科學 傳染病學 婦科學 眼科學 藥物學
兒科學 外科學 產科學 花柳病學 皮膚病學 耳鼻喉喉科學 處方學 製藥學
種痘學
以上各書對於醫藥各科大致收羅無遺於醫藥界應有盡有說經緯無不詳載爲臨床有益文字
▲特價
計共廿六厚册西式裝訂原定價廿一元現承幸福報館朱振聲大醫家提倡極力勸減書價以示
普及故特減爲大洋八元寄費一概在內
上海三馬路雲南路口幸福書局代售

楊志一 醫師

朱振聲 醫師

診例
(甲)特號二元 隨到隨診
(乙)門診一元 隨到隨診
(丙)出診四元 隨到隨診
(丁)膏丸方四元 次日取件
(戊)急病隨請隨到
時間 診所
以上四時至九時 診所
後時診止四時下 診所
一弄第樂雲 診所
家第一里會南 診所
三九四三六 診所
啓處號掛

幸福報

第三五三期
(日九月七年十二國民)
分二洋售份每
口路南雲馬三海上址館
廣告價目
每行每字 每日五角
計五方格 共
元均排於新
聞中長期入新
聞新

僱用乳母之選擇

生母與嬰兒有密切之關係。如生母有疾病。萬一不能哺乳。則
不得不僱乳母。惟對於乳母性情之優劣。體質之強弱。乳汁之
濃淡。疾病之有無。非詳細檢查不可。茲列其要點如下。
(一)年齡二十歲至三十歲。血氣最旺。體力最強。在此期內。
乳汁最佳。分量亦多。但乳母應以此期內之無產婦。與生
母之年齡相近者爲宜。
(二)分娩期——生母哺乳。乳汁隨嬰兒之年月而改變。自然適
合其發育。但乳母不然。故應求與生母相近者爲要。萬一
難以求得。則至遲不可過三月以上。否則有害於小兒之消
化器。不可不慎。如數月之嬰兒。而吸飲初產婦之乳。亦
屬不宜。故最早在二星期以後。
(三)體格——儀容端正。面色紅潤。筋骨健壯。毛髮烏澤。齒
牙純白。而無蛀患。齒齦鮮紅。而不浮腫。口鼻無一臭氣。
身體瘦肥及長短均適度。則甚相宜。
(四)性情——宜溫和仁慈。精細智慧。愛清潔。不粗暴。不嫉
妬。不陰險。不淫邪。不狡詐。不忌憚。不嗜酒。不奢侈
者。爲佳。蓋能感化兒童之性情。故不可不鄭重也。
(五)生育數——生育多而且早者。則乳量多。但不免稀薄。且
生育二次以上。五次以下爲宜。
(六)疾病——乳母若患諸患。即氣脹疾。白濁。梅毒。肺癆。
及各種傳染病等。均不宜用。

風流小病

世上惟有少年人最快活。年
紀既輕。面目又麗。水也招
得出的肌膚。再配上幾件時
髦的衣服。逛逛馬路。白相
室。其樂無窮。然而樂極
每易生悲。因此有的患遺精
。有的患白濁。百藥無效。
痛苦萬狀。本館代售的遺精
。專治白濁。都是對症的特效
藥。(專治白濁)白濁丸。
(專治白濁)都是對症的特效
藥。(按以上內丸每盒壹
元)上三馬路雲南路口幸福
報館售

嬰兒養育上之注意

(姚伯麟)

嬰兒食物中。母乳最爲適宜。故母乳如何飲之而無害。不致引起胃腸病乎。則定分其時間而論。而在生後。

第一星期者。由十至十五天。至十六天。

第二星期者。由十三至十八天。

第三星期者。由十四至二十天。

第四星期者。由十六至二十天。

以二十六天爲期。

第五星期至第三十三星期者。由二十至三十六天。

第四月至第六月者。由二至十四天。

第六月至第九月者。由三至十四天。

第十月至三十八天。

約當中國八錢二分三厘者。

爲母乳之適量。母乳由午前六時。至午後十時。兩小時一回。夜間每三小時一回。母乳者不能哺乳者。

(未完)

經驗良方

單方錄 (黃勝白)

全當歸一匙煎汁不顯。可治一切痛經及經期不調諸病。

此方余試之屢矣。靈效非常。治痛經尤佳。痛經無從定其齊量。故服之者。僅至減輕而止。不能斷根也。博物志稱當歸能止痛。不可解。吾初謂當歸原無止痛之用。後乃知所謂止痛者。殆即止痛經而言也。此藥本極佳之品。惟中國有之。乃中國醫家自標藥之目。強與他種補藥數十百種。爲老婦人熬膏煎藥之用。其真正之效用。乃全然隱矣。反是西人識其功能。製爲流膏。Bismarck。主一切子宮月經各症。自是當歸出口日多。(廣東有專販當歸之店自成一街)而當歸

痺厥治療法

(李健頤)

定義 痺厥。與厥病相合也。

原因 寒氣外侵。冷氣內結。即成厥病。血行粘滯。

病理 年高血衰。氣機不旺。又因陰寒。寒冷外襲。侵入血中。血液受寒冷之凝滯。遂成固質。凝滯不暢。則氣機不通。氣機阻滯。寒薄而厥。厥而愈重。素問金匱言曰。『冬善病痺厥』即此之故也。

症狀 初起發時。身必痛。脚氣腫痛。有如中風。六脈沉滯。肝心虛瀉。

診斷 此症非重用。壯補溫血之品。則莫能奏效。功。

療法 和血理氣。暖凝祛寒爲主。用妙當歸酒白芍。川芎。熟地。黃芪。半夏。威靈仙。羌活。獨活。附片。肉桂。防風。地黃。黃良。巴戟。等味。常服即可奏功。

大東藥局衛生書

書名	冊數	折實價格
新時病論	四冊	七角
中西合參外科大全	二冊	一元〇八分
中西合參婦科大全	二冊	一元〇八分
中西合參幼科大全	二冊	一元〇八分
古今名醫方類編	八冊	二元二角八分
全國名醫驗案類編	四冊	四角八分

百病指南

(張治河)

肢體痠軟。全體津液。一爲內熱消耗。一爲肺臟吸去。關節失其濡養。故痿廢也。本症治法。宜首補肺生津。消痰清熱。如桑葉。散酒。燥肺。潤燥。滋潤。玉竹。麥冬。石荷。等方。探擇用之可也。

此症者。切忌香燥之品。可以常食梨。柿。荸薺。甘蔗。葡萄。香膠。及牛乳。雞蛋。肉汁。等物。以養清熱生津。而佐藥力。更宜常在室氣新鮮之處。練習深呼吸法。既可藉其呼吸。吸養。淘汰不良之質。又可擴張肺臟。促進細胞活動。俾痿縮之症。漸得奮興。一舉數得。利莫大焉。

痰飲

本症原因。爲氣管粘膜炎。西醫名爲「慢性支氣管炎」。多因常患感冒。

肺癆肺癰肺瘰

陳耀堂

癰者。瘰也。如土之壅而不通。熱聚不散而爲瘰也。金匱云。口中辟辟。喉中隱隱。肺反滑數者。此爲肺癰。肺癰之候。其人咳嗽。膿血。氣味腥臭。凡患此症。或體質素熱。或爲陰虛。或熱病之後。復感熱邪。或五臟蘊積之熱。與夫胃中停著之火。上乘乎肺。受火熱薰灼。則痰爲之凝。血爲之凝。由是浸淫而成癰。按其脈數而實。則大熱經中可知。咳而喘滿。咽燥不渴。多唾濁沫。時時振寒者。乃熱則傷氣。氣不調和故咳而胸滿。氣不充足。故皮毛空疎而振寒。咽乾而時時唾濁沫者。津液被燥。熱邪迫肺而上行也。此即所謂熱之所過。血爲之凝滯。畜結癰膿。膿吐如米粥者也。斯時當清去其熱邪。寧肺大寒湯。湯爲主。餘如桑葉。麥冬。有桔梗湯。或千金葶藶湯。桂枝去芍藥湯等。皆可加減施用。肺癰之時。失治或誤治。則必致膿成而死。(按近人有以鹹芥茶治肺癰服之有效。不效。然究屬丹方之類。未可爲訓。惟有